

GLOBULKI DOPOCHWOWE

OPIS PRODUKTU

Globulki dopochwowe **HydroVag®** nawilżają śluzówkę ścian pochwy, wspomagają procesy regeneracyjne, pomagają utrzymać fizjologiczne pH, a także chronią pochwę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Opakowanie zawiera 7 globulek.

SKŁAD

1 globulka dopochwowa zawiera: **10 mg hialuronianu sodu, glikogen, kwas mlekowy** oraz substancje pomocnicze: mleczan sodu i glicerydy półsyntetyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

Funkcją nabłonka pochwy jest utrzymanie właściwego nawilżenia i pH pochwy. Stan ten może zostać zaburzony m.in.:

- na skutek niedoboru estrogenów m.in. w okresie menopauzy naturalnej lub wywołanej przyczynami medycznymi (usunięcie macicy wraz z przydatkami),
- podczas przewlekłego przyjmowania leków hormonalnych (m.in. agonistów gonadoliberyny – GnRH, glikokortykosteroidów),
- w stanach stresowych,
- w wyniku chemioterapii, radioterapii.

Do najczęstszych objawów zaburzenia funkcji nabłonka pochwy, w tym atrofii pochwy, należą: suchość, pieczenie, swędzenie, dyskomfort oraz ból podczas stosunku (dyspareunia).

DZIAŁANIE

Po umieszczeniu w pochwie globulka **HydroVag®** ulega stopieniu i wytwarza warstwę powleającą błony śluzowe, tworząc środowisko sprzyjające przywróceniu prawidłowego stanu nabłonka pochwy. Hialuronian sodu zabezpiecza i nawilża śluzówkę pochwy oraz wspomaga proces gojenia i odbudowy tkanek. Kwas mlekowy pomaga utrzymać pH pochwy na prawidłowym poziomie $\text{pH} \leq 4,5$, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji. Glikogen pełni funkcję barierową oraz stanowi składnik odżywczy dla pałeczek kwasu mlekowego, które tworzą naturalną florę bakteryjną pochwy chroniącą przed infekcjami i pomagającą w utrzymaniu prawidłowego pH.

Kiedy należy stosować HydroVag®:

W celu łagodzenia uczucia **suchości i dyskomfortu (napięcia, świądu, pieczenia)** w okolicach intymnych spowodowanego:

- niedoborem estrogenów (m.in. w okresie okołomenopauzalnym),
- zanikiem błony śluzowej pochwy (atrofia),
- nasilonym stresem.

W celu **ułatwienia regeneracji nabłonka** pochwy:

- w okresie okołomenopauzalnym, kiedy dochodzi do zaniku błony śluzowej pochwy (atrofia),
- w przypadku wystąpienia nieprawidłowych zmian w nabłonku pochwy (dystrofii) spowodowanych np. stosowaniem leków hormonalnych (między innymi agonistów gonadoliberyny – GnRH, glikokortykosteroidów),
- po radio- i chemioterapii,
- po zabiegach ginekologicznych (np. po wziernikowaniu, po zabiegach elektrokoagulacji, krioablacji oraz po zabiegach chirurgicznych na przykład po nacięciu krocza),
- po porodzie.

W celu łagodzenia bólu **w przypadku bolesnych stosunków** (dyspareunia).

W celu łagodzenia dyskomfortu związanego z **obrzękiem, zaczerwienieniem, świądem** okolic sromu oraz pojawieniem się **nieprawidłowej wydzieliny**.

Wspomagająco, w celu **utrzymania prawidłowej flory i pH pochwy**, na przykład po kuracji antybiotykami.

DAWKOWANIE

Kuracja podstawowa:

1 globulka dopochwowa na noc przez 7 kolejnych dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kuracja podtrzymująca:

1 globulka dopochwowa na noc co 2-3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

W przypadku uzupełnienia kuracji podstawowej kuracją podtrzymującą, łączny czas terapii może wynieść do 30 dni. Po tym czasie należy przerwać kurację na okres 7 dni.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną. Nie należy stosować dwóch dawek preparatu jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie umyć ręce.
2. Jeśli na skutek narażenia produktu na działanie wysokiej temperatury konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce.
3. Oderwać jedno gniazdo z blistra, następnie rozchylić listki folii, powoli oddzielić je od siebie i ostrożnie wydobyć globulkę.
4. Delikatnie umieścić globulkę głęboko w pochwie. W celu ułatwienia aplikacji globulkę można zwilżyć ciepłą przegotowaną wodą.

OSTRZEŻENIA

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
- w przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest stosowanie globulek pod nadzorem lekarza,
- ze względu na brak odpowiednich badań, w czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem,
- nie stosować równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo,
- preparat stosowany z lekami miejscowo znieczulającymi, ze względu na zawartość w składzie hialuronianu sodu, może wydłużać okres znieczulenia,
- nie stosować w trakcie menstruacji,
- bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmować współżycia płciowego,
- nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu ze względu na obecność w składzie preparatu modyfikowanych tłuszczów,
- nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu,
- nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra,
- nie połykać,
- wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli po zastosowaniu preparatu pojawią się objawy niepożądane tj. nasilenie świądu, pieczenia, wysypka itp. należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

W celu zabezpieczenia bielizny przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie kuracji należy stosować wkładki higieniczne.

Każdą globulkę należy stosować jednorazowo. Ponowne użycie tej samej globulki niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (15 - 25°C), w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.



OKRES WAŻNOŚCI WYROBU

3 lata

WYRÓB MEDYCZNY



WYTWÓRCA

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
 BIOMED Spółka Akcyjna
 30-224 Kraków, Al. Sosnowa 8
 POLSKA
 tel: + 48 12 37 69 200
 fax: + 48 12 37 69 205
 e-mail: marketing@biomed.pl

DATA OPRACOWANIA / AKTUALIZACJI

2015-12



Wytwórca



Użyć do



Numer serii



Zajrzyj do instrukcji użytkownika



Niesterylny



Do jednorazowego użytku



Ograniczenie dopuszczalnej temperatury